



Klyngen

HOLE IN ONE

Udførelse af beplantning

Landskabsstrategi
10.09.2026

RYDNINGSPAN, KLYNGEN

- Rydning
- Udtyndning
- Portal
- Test af 'Vild med Vilje'



RYDNINGSPAN, SLANGEN

- Rydning
- Udtyndning
- Portal
- Test af 'Vild med Vilje'



BEPLANTNING, NORDLIGE KANTER

BEPLANTNINGSSTRATEGIEN

Beplantningsstrategien er struktureret med en nord-syd graduering i beplantningens tæthed og højde. Beplantningen langs de nordlige kanter af villaklyngerne består af tættere og højere buske bestående af *hassel*, *blærespiræa*, *syren*, *uægte jasmin* og *purpurpil*, der brydes op af mindre solitære træer bestående af *røn*, *engriflet hvidtjørn* og *vildæble*.

Beplantningens højde og tæthed er med til at skabe læ og rumlighed, mens den danner en naturlig afskærmning mellem private og fælles arealer. Beplantningen etablerer indramning uden at danne hårde grænser og fastholder dermed et blødt og naturligt skovpræg. Beplantningen plantes i et organisk forløb, så det ikke fremstår som en hæk.

De valgte arter er sammensat, så beplantningen har en lang sæsonmæssig variation. Allerede sidst på vinteren og i det tidlige forår bidrager hassel med sine karakteristiske rakler, efterfulgt af blomstring fra røn, engriflet hvidtjørn og vildæble i foråret. I forsommeren overtager syren og uægte jasmin med markante og duftende blomster, mens blærespiræa bidrager med blomstring senere på sommeren. Herefter skabes yderligere variation gennem frugter, bær og skiftende løvfarver, mens beplantningens forskellige vækstformer og grene fastholder struktur og karakter gennem vinteren.

På tværs af beplantningen gælder de samme grundprincipper: robuste og klimatisk modstandsdygtige arter, der kræver begrænset vanding og drift. Kombinationen af hjemmehørende arter og velafprøvede, robuste kulturplanter skaber en varieret og naturpræget beplantning, der understøtter et rigt dyre- og planteliv. De tætte buskstrukturer giver læ og skjul, mens blomstring, bær og frugter bidrager med føde til insekter og fugle. Samlet understøtter beplantningen et levende landskab med høj grad af robusthed og lavt driftsbehov.



Engriflet hvidtjørn, *Crataegus monogyna*



Røn, *Sorbus Aucuparia*



Syren, *Syringa vulgaris*



Purpurpil, *Salix Purpurea*



Blærespirea, *Physocarpus opulifolius*



Hassel, *Corylus avellana*



Uægte Jasmin, *Philadelphus coronarius*



Vildæble, *Malus Sylvestris*

BEPLANTNING, SYDLIGE KANTER

BEPLANTNINGSSTRATEGIEN

Beplantningsstrategien er struktureret med en nord-syd graduering i beplantningens tæthed og højde. Beplantningen langs de sydlige kanter af villaklyngerne består af mindre buske bestående af *fjeldribs*, *solbær*, *surbær*, *haveblåbær*, *rosmarinpil*, *krybende gråris*, *mosepors* og *birkebladet spiræa*. S sammensætningen er tilpasset de sydvendte kanter, hvor beplantningen skal understøtte overgangen mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Beplantningens lave højde fastholder udsynet fra villaklyngerne og skaber en visuel forbindelse til det omkringliggende landskab og det skrånende terræn. Samtidig skaber buskene rum og markerer overgangen mellem private og fælles arealer uden at danne en lukket afgrænsning. Beplantningen understøtter dermed landskabets åbne karakter og de lange kig. Beplantningen plantes i et organisk forløb, så det ikke fremstår som en hæk.

De valgte arter skaber variation gennem blomstring, duft, bær, frugter og skiftende løvfarver. Fjeldribs, mosepors og birkebladet spiræa bidrager med blomstring, mens solbær og haveblåbær tilfører spiselige bær. Rosmarinpil og krybende gråris tilfører variation gennem deres karakteristiske vækstformer og struktur.

På tværs af beplantningen gælder de samme grundprincipper: robuste og klimatisk modstandsdygtige arter, der kræver begrænset vanding og drift. S sammensætningen skaber en varieret og naturpræget beplantning, der bidrager med føde og levesteder for insekter og fugle, samtidig med at den lave højde bevarer gode lysforhold og landskabets åbne karakter.



Haveblåbær, *Vaccinium corymbosum*



Surbær, *Aronia Melanocarpa*



Krybende gråris, *Salix Repens 'Saret'*



Rosmarinpil, *Salix repens 'Rosmarinifolia'*



Solbær, *Ribes nigrum*



Mosepors, *Myrica gale*



Birkebladet Spiræa, *Spiraea betulifolia*



Fjeldribs, *Ribes alpinum*

BEPLANTNING, PRIVATE HAVER


BEPLANTNINGSSTRATEGIEN

Beplantningsstrategien for beplantningen mellem husene er struktureret med en nord-syd graduering i beplantningens tæthed og højde. Beplantningen mellem husene består af en blanding af mellemstore og mindre buske som *blærespiræa*, *surbær*, *fejldribs*, *rosmarinpil*, *krybende gråris* og *birkebladet spiræa*. Sammensætningen bygger videre på arterne i de øvrige beplantningsgrupper og skaber en naturlig overgang mellem den højere beplantning mod nord og den lave beplantning mod syd.

Beplantningen har en moderat højde, så den skaber rum og struktur mellem husene uden at lukke området eller begrænse udsyn og lys. De forskellige vækstformer skaber en varieret og landskabelig karakter, hvor oprette og tætte buske kombineres med mere lette og horisontale former.

De valgte arter bidrager med variation gennem blomstring, løv, efterårsfarver og karakteristiske vækstformer. Blærespiræa og surbær tilfører volumen og struktur, mens fejldribs og birkebladet spiræa bidrager med blomstring og lethed. Rosmarinpil og krybende gråris tilfører fine, mere transparente og horisontale strukturer, der understøtter det landskabelige udtryk.

På tværs af beplantningen gælder de samme grundprincipper: robuste og klimatisk modstandsdygtige arter, der kræver begrænset vanding og drift. Sammensætningen skaber en harmonisk og naturpræget beplantning, der understøtter biodiversiteten og samtidig skaber en tydelig grøn struktur mellem husene.



Fjeldribs, Ribes alpinum



Surbær, Aronia Melanocarpa



Krybende gråris, Salix Repens 'Saret'



Rosmarinpil, Salix repens 'Rosmarinifolia'



Birkebladet Spiræa, Spiraea betulifolia



Blærespirea, Physocarpus opulifolius

BEPLANTNING, NORDLIGE KANTER


UDPLANTNING

Buskene placeres i et sammenhængende forløb, uden fast eller ensartet rytme i planternes placering, for at skabe diversitet og liv i buskbeplantningen. Hver art plantes i grupper af 2–3 planter, mens beplantningen brydes op af enkeltstående træer, der placeres med varierende afstand. Træerne tilfører variation og fungerer som naturlige pauser i den sammenhængende buskbeplantning.

Over tid vil de enkelte arter udvikle sig forskelligt i både højde og bredde. De højere og mere bredtvoksende buske vil danne beplantningens volumen og lægivende struktur, mens de mindre arter udfylder mellemrummene og skaber en mere nuanceret beplantning. Målet er en beplantning, der gradvist vokser sammen, men som fortsat opleves varieret og naturlig.

Buskbeplantningen etableres med planter på 1–1,2 meters højde ved udplantning. Som udgangspunkt plantes der 1 busk pr. halvanden meter, men planteafstanden tilpasses de enkelte arters forventede bredde og vækstform. De mere bredtvoksende arter gives større afstand, så de over tid kan udvikle deres naturlige form og samtidig indgå i et sammenhængende beplantningsforløb.

Efter udplantning vil planterne have en etableringsfase, hvor udviklingen af rodnettet prioriteres. Herefter kan der som et vejledende gennemsnit regnes med en tilvækst på omkring 0,5 meter årligt, dog med variation mellem arterne og afhængigt af vækstforholdene. Beplantningen vil derfor gradvist lukke sig og udvikle den ønskede tæthed og volumen over de første år.



70 planter pr. 100 meter
Planteafstand 1,5 m

A: Blærespiræa
co. 80-120 cm
Stk. 18 pr. 100 m

B: Hassel
co. 80-120 cm
Stk. 16 pr. 100 m

C: Purpurpil
co. 80-120 cm
Stk. 12 pr. 100 m

D: Syren
co. 80-120 cm
Stk. 10 pr. 100 m

E: Uægte Jasmin
co. 80-120 cm
Stk. 8 pr. 100 m

F: Engriflet hvidtjørn
co. 80-120 cm
Stk. 2 pr. 100 m

G: Røn
co. 80-120 cm
Stk. 2 pr. 100 m

H: Vildæble
H 10-12 cm
Stk. 2 pr. 100 m


BEPLANTNING, SYDLIGE KANTER

UDPLANTNING

Buskene placeres som et varieret forløb, hvor beplantningen følger overgangen fra skygge under de eksisterende træer til åbne områder med fuld sol og tilbage til skygge. Arterne sammensættes i mindre grupper på 1–4 planter, som forskydes i forhold til hinanden og tilpasses de lokale lysforhold. De højere buske placeres primært som strukturgivende elementer, mens lavere og mere bredtvoksende arter placeres foran og imellem disse. På den måde opstår en gradvis variation i beplantningens højde og tæthed gennem hele forløbet.

Sammensætningen er samtidig valgt med blik for planternes udvikling. Ved udplantning vil der være tydelige mellemrum mellem de enkelte grupper, men efterhånden som buskene vokser til vil dette ændre sig. De lidt højere arter vil med tiden skabe mere volumen og rumdannelse, mens de lavere arter vil lukke beplantningen fra bunden. Særligt i overgangen mellem sol- og skyggezonerne vil planternes forskellige vækstformer være med til at skabe en glidende og naturlig overgang.

Buskbeplantningen etableres med planter på 0,5-1 meter. Ved udbplantning avendes en afstand på omkring 90 cm som udgangspunkt, men justeres efter den enkelte arts forventede bredde og vækstform. Efter udplantning vil planterne have en etableringsfase, hvor udviklingen af rodnettets prioriteres. Herefter kan der som et vejledende gennemsnit regnes med en tilvækst på omkring 0,5 meter årligt, dog med variation mellem arterne og afhængigt af vækstforholdene. Beplantningen vil derfor gradvist lukke sig og udvikle den ønskede tæthed og volumen over de første år.



110 planter pr. 100 meter
Planteafstand 0,9 m

- | | | |
|--|--|--|
|  A: Birkebladet spiræa
co. 80-120 cm
Stk. 24 pr. 100 m |  D: Krybende gråris
co. 80-120 cm
Stk. 4 pr. 100 m |  G: Solbær
co. 80-120 cm
Stk. 12 pr. 100 m |
|  B: Fjeldribs
co. 80-120 cm
Stk. 20 pr. 100 m |  E: Mosepors
co. 80-120 cm
Stk. 6 pr. 100 m |  H: Surbær
co. 80-120 cm
Stk. 12 pr. 100 m |
|  C: Haveblåbær
co. 80-120 cm
Stk. 24 pr. 100 m |  F: Rosmarinpil
co. 80-120 cm
Stk. 8 pr. 100 m | |

BEPLANTNING, PRIVATE HAVER

UDPLANTNING





Buskene kan placeres som et varieret forløb, hvor arterne sammensættes i mindre grupper på 1–4 planter, som forskydes i forhold til hinanden. Det anbefales, at de højere buske som *blærespiræa* og *rosmarinpil*, placeres primært som strukturgivende elementer, og mod den nordlige ende, mens lavere og mere bredtvoksende arter som *birkebladet spiræa*, *fjeldribs*, *krybende gråris* og *surbær* placeres imellem disse. På den måde opstår en gradvis variation i beplantningens højde og tæthed gennem forløbet, uden det bliver for skyggefuldt eller gror husejerne over hovedet.

Sammensætningen er samtidig valgt med blik for planternes udvikling. Ved udplantning vil der være tydelige mellemrum mellem de enkelte grupper, men efterhånden som buskene vokser til vil dette ændre sig. De lidt højere arter vil med tiden skabe mere volumen og rumdannelse, mens de lavere arter vil lukke beplantningen fra bunden.

Buskbeplantningen etableres med planter på 0,5-1 meter. Ved udbplantning avendes en afstand på omkring 90 cm som udgangspunkt, men justeres efter den enkelte arts forventede bredde og vækstform. Efter udplantning vil planterne have en etableringsfase, hvor udviklingen af rodnettet prioriteres. Herefter kan der som et vejledende gennemsnit regnes med en tilvækst på omkring 0,5 meter årligt, dog med variation mellem arterne og afhængigt af vækstforholdene. Beplantningen vil derfor gradvist lukke sig og udvikle den ønskede tæthed og volumen over de første år.

Forventet planter 20 stk.
Planteafstand 0,9 m

- A: Birkebladet spiræa
co. 80-120 cm
- B: Blærespiræa
co. 80-120 cm
- C: Fjeldribs
co. 80-120 cm
- D: Krybende gråris
co. 80-120 cm
- E: Rosmarinpil
co. 80-120 cm
- F: Surbær
co. 80-120 cm



MÆNGDE PÅ BEPLANTNING, NORDLIGE KANTER

- Fase 1: 699 løbende meter
- Fase 2: 655 løbende meter, udføres senere



MÆNGDE PÅ BEPLANTNING, SYDLIGE KANTER

- Fase 1: 317 løbende meter
- Fase 2: 539 løbende meter, udføres senere



MÆNGDE PÅ BEPLANTNING, NORDLIGE KANTER

- Fase 1: 36 løbende meter
- Fase 2: 146 løbende meter, udføres senere



MÆNGDE PÅ BEPLANTNING, SYDLIGE KANTER

- Fase 1: 318 løbende meter
- Fase 2: 258 løbende meter, udføres senere



OMRÅDER VED ANKOMST

STAUDEBEDE

Ved ankomstområderne etableres en karakterfuld staudebepantning, som understøtter portalerne og markerer overgangen til sommerhusområdet. Bepantningen er sammensat af robuste, hjemmehørende og naturprægede stauder, der tilsammen skaber et varieret og årstidsbestemt udtryk.

Stauderne plantes i grupper af 2 m², hvor hver art gentages tre gange inden for bedet. Det giver en tydelig rytme og sammenhæng i beplantningen, samtidig med at de enkelte arter får mulighed for at danne markante, sammenhængende planteflader.

Det samlede bed udgør ca. 60 m² og beplantes med en blanding af *almindelig akeleje*, *blodrød storkenæb*, *almindelig sankthansurt*, *almindelig kattehale*, *dagpragtstjerne*, *engnellikerod* og *almindelig torskemund*.

Artsvalget giver en varieret beplantning med forskellig højde, blomstringstid og struktur. Kombinationen bidrager til en naturlig og frodig ankomst, som både har en klar identitet omkring portalerne og samtidig understøtter sommerhusområdets grønne og landskabelige karakter.

Planteantal pr. m²:

- Almindelig akeleje – 7 planter/m²
- Blodrød storkenæb – 7 planter/m²
- Almindelig sankthansurt – 7 planter/m²
- Almindelig kattehale – 6 planter/m²
- Dagpragtstjerne – 7 planter/m²
- Engnellikerod – 8 planter/m²
- Almindelig torskemund – 7 planter/m²



Almindelig torskemund, *Linaria vulgaris*



Engnellikerod, *Geum rivale*



Almindelig akeleje, *Aquilegia vulgaris*



Almindelig kattehale, *Lythrum salicaria*



Blodrød storkenæb, *Geranium anguineum*



Dagpragtstjerne, *Silene dioica*



Almindelig sankthansurt, *Hylotelephium telephium*

6 OPHOLDSSTEDER



Slangen:

Golfsvinget fra nr. 1 til nr. 142
Gatten
9640 Farsø

Klyngen:

Golfsvinget fra nr. 143 til nr. 300
Gatten
9640 Farsø